CHC.be

MON TRAJET POSTOPÉRATOIRE

CHIRURGIE BARIATRIQUE

Chirurgie abdominale, endocrinienne, de l'obésité et des tissus mous



Emportez toujours cette brochure avec vous lors de vos consultations

Clinique CHC MONTLÉGIA

CHECK LISTE AVANT SORTIE

1 SI 3 TTT



- Température
- Tachycardie
- Tachypnée

→ Contactez le secrétariat de chirurgie digestive au 04 355 41 20
ou votre médecin traitant
ou le services des urgences du Groupe santé CHC

2 CICATRICES

Colle biologique

- → ne pas frotter
- → ne pas mettre de pansement
- → douches seules autorisées

3 TRAITEMENT DE SORTIE

(carte d'identité)



- → **Dafalgan®** : antidouleur
- → **Clexane®** : prévention phlébites
- → **Pantomed®** : anti-acide et protection des sutures

4 VITAMINES

Omnibionta 1 mois puis vitamines spécifiques à la chirurgie bariatrique au choix : Barinutrics/ Surgiline/WLS/MVM
(voir carnet post-opératoire, page 10)

5 PROTÉINES

1/4 par 1/4 de mesurette jusqu'a 2 mesurettes/j
(voir carnet post-opératoire, page 8)

6 MOBILISATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

- → Dès que possible, en fonction des douleurs
- → Par vous même ou à la clinique CHC MontLégia (contactez notre kiné Saliha Chachoua au 04 355 66 50, *voir carnet post-opératoire, page 12*)

7 RÉALIMENTATION



Boissons
- → 30 min avant ou après repas
- → gorgée par gorgée
- → 1,5 à 2 litres par jour



Repas
- → à table et concentré
- → 3 repas et 3 collations
- → 30 minutes
- → suivre le plan alimentaire

(voir carnet post-opératoire, page 5-6-7)

8 AUTRES TRAITEMENTS

- → Médicaments **diabète/tension/cholestérol/ thyroïde** : à adapter avec votre médecin traitant ou spécialiste
- → **Proscrire** anti-inflammatoires et aspirine



9 ECOUTER VOTRE CORPS

- → Douleur
- → Activité physique
- → Alimentation
- → Médicaments

10 NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE



pour toute question ou besoin de support :
04 355 41 20 ou chirabdomle@chc.be

Retrouvez la brochure postopératoire ici

UN JOUR
APRÈS L'AUTRE

RENDEZ-VOUS POSTOPÉRATOIRES

Prise, modification ou annulation de RDV : 04 355 41 20

Tout rendez-vous non annulé 24h à l'avance sera facturé 20€.

Date opératoire ...../...../.....

Type d'intervention : .....

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[mle255rdvpostchirabdo_version brochure RDVpostOp]

NOM : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Unité : .....

Chambre : ..... Lit : .....

Chirurgien

Dr A. Boitsios - Dr L. Brescia - Dr N. Debergh - Dr F. Jehaes



Route 205

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

le ..... / ..... / ..... à ..... h ..... + faire une prise de sang *(Annexe 3)* et une échographie *(Annexe 4)* 15 j avant ce rdv

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

Nutritionniste

Dr A. Schaeken



Route 205

le ..... / ..... / ..... à ..... h ..... + faire une prise de sang *(Annexe 1)* 15 j avant ce rdv

le ..... / ..... / ..... à ..... h ..... + faire une prise de sang *(Annexe 2)* 15 j avant ce rdv

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

↳ Prévoir un RDV 2 ans après l'intervention + faire une prise de sang 15 j avant ce rdv

Diététicienne

S. Malmendier - J. Sterck - M. Thieren



Routes 206 205

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

Prévoir un RDV 18 mois après l'intervention

Psychologue

S. Baccus - C. Nicolas



le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

Autre RDV : Spécialité .....



le ..... / ..... / ..... à ..... h .....

Clinique CHC MONTLÉGIA



UN CENTRE DE PRÉLÈVEMENT PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Retrouvez toutes nos adresses sur chc.be/laboratoire



Clinique CHC Hermalle

rue Basse Hermalle 4
B-4681 Hermalle /s Arg.

Accès : rue Chapelle Notre-Dame route 148 (-1)

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Le samedi de 8h à 12h

A domicile, du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 04 374 71 86 04 374 71 87 ou 04 374 71 88



Clinique CHC Heusy

rue du Naimeux 17
B-4802 Heusy

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Le samedi de 7h30 à 12h

A domicile du lundi au vendredi sur rendez-vous au 087 21 37 30



Clinique CHC MontLégia

bd Patience et Beaujonc 2
B-4000 Liège
Parking F - Route 201

> Adultes :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi de 8h à 16h

> Enfants :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Le samedi de 8h à 13h

A domicile sur rendez-vous du lundi au vendredi au 04 342 84 28 (ASD)



Clinique CHC Waremme

rue de Sélys-Longchamps 47
B-4300 Waremme

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Le samedi de 8h à 12h

A domicile du lundi au vendredi sur rendez-vous au 04 342 84 28 (ASD)

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou
❍ Chaînes légères libres (RD)
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance	
Séd.+culture	❍			
Glucose	❍	❍		
Protéines	❍	❍		
Urée	❍	❍	❍	
Créatinine	❍	❍	❍	
Acide urique	❍	❍	❍	
Na	❍	❍		
K	❍	❍		
Cl	❍	❍		
Ca	❍	❍	❍	
P	❍	❍	❍	
Mg	❍	❍		
µalbumine	❍	❍		(RD)
α1 µglobuline	❍	❍		
β2 µglobuline	❍	❍		
Citrate	❍	❍		
Oxalate	❍	❍		
Osmolalité	❍	❍		
Electro. Prot.	❍	❍		
Bence-Jones	❍	❍		

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) ((M) à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH ((M) à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* ((V) à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* ((M) à 4°C)
❍ Vitamine E* ((M) à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

ANNEXE 2

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou (RD)
❍ Chaînes légères libres
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance	
Séd.+culture	❍			
Glucose	❍	❍		
Protéines	❍	❍		
Urée	❍	❍	❍	
Créatinine	❍	❍	❍	
Acide urique	❍	❍	❍	
Na	❍	❍		
K	❍	❍		
Cl	❍	❍		
Ca	❍	❍	❍	
P	❍	❍	❍	
Mg	❍	❍		
µalbumine	❍	❍		(RD)
α1 µglobuline	❍	❍		
β2 µglobuline	❍	❍		
Citrate	❍	❍		
Oxalate	❍	❍		
Osmolalité	❍	❍		
Electro. Prot.	❍	❍		
Bence-Jones	❍	❍		

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) ((M) à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH ((M) à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* ((V) à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* ((M) à 4°C)
❍ Vitamine E* ((M) à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

ANNEXE 3

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou
❍ Chaînes légères libres (RD)
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance
Séd.+culture	❍		
Glucose	❍	❍	
Protéines	❍	❍	
Urée	❍	❍	❍
Créatinine	❍	❍	❍
Acide urique	❍	❍	❍
Na	❍	❍	
K	❍	❍	
Cl	❍	❍	
Ca	❍	❍	❍
P	❍	❍	❍
Mg	❍	❍	
µalbumine	❍	❍	(RD)
α1 µglobuline	❍	❍	
β2 µglobuline	❍	❍	
Citrate	❍	❍	
Oxalate	❍	❍	
Osmolalité	❍	❍	
Electro. Prot.	❍	❍	
Bence-Jones	❍	❍	

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MHEWS-DE-ALL-019 V2

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) ((M) à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH ((M) à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* ((V) à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* ((M) à 4°C)
❍ Vitamine E* ((M) à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

CHC GROUPE SANTÉ

DEMANDE D'EXAMEN EN IMAGERIE MÉDICALE

ANNEXE 4

RENDEZ-VOUS


Clinique CHC MontLégia
bd Patience et Beaujonc 2
B-4000 Liège
04 355 41 30

Centre Médical du Haut-Pré
rue du Haut-pré 56
B-4000 Liège
04 368 31 00

Centre Médical Mosan
Rue de Lantin 122
B-4000 Liège (Rocourt)
04 247 81 20

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

NOM : .....
Prénom : .....
Date de naissance : .....
Unité : .....
Chambre : ..... Lit : .....



Examen proposé : Echographie abdominale

Bilan après chirurgie bariatrique : exclure lithiases vésiculaires, stéatose hépatique et hépatomégalie

Examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostique :

- ❑ IRM
- ❑ CT
- ❑ Méd. Nucléaire
- ❑ RX
- ❑ Sénologie
- ❑ Autre
- ❑ US
- ❑ Doppler

Cachet du médecin prescripteur :

❑ **Copie du compte rendu au docteur :**

.....
.....
.....
.....

Date : ...../...../.....
Signature

Rendez-vous en imagerie médicale

le ..... /..... /..... à ..... h .....

- ❑ Clinique CHC MontLégia)
- ❑ Centre Médical du Haut-Pré
- ❑ Centre Médical Mosan

L'échographie abdominale est un examen radiologique indolore qui permet l'étude des organes pleins de la cavité abdominale (foie, vésicule, pancréas, reins) à l'aide d'une sonde émettant un faisceau ultrasonore.



À quoi sert l'échographie ?

~ A vérifier si des lithiases (pierres) seraient apparues dans la vésicule biliaire. Dans ce cas, une intervention de retrait de la vésicule (cholécystectomie) pourrait être proposée.

~ À déterminer si une hépatomégalie (foie gros) ou une stéatose (foie gras) éventuellement présentes avant l'intervention, se sont améliorées.



Clinique CHC MontLégia

bd Patience et Beaujonc 2
B-4000 Liège
04 355 41 30



Centre Médical du Haut-Pré

rue du Haut-pré 56
B-4000 Liège
04 368 31 00



Centre Médical Mosan

Rue de Lantin 122
B-4000 Liège (Rocourt)
04 247 81 20

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou (RD)
❍ Chaînes légères libres
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance
Séd.+culture	❍		
Glucose	❍	❍	
Protéines	❍	❍	
Urée	❍	❍	❍
Créatinine	❍	❍	❍
Acide urique	❍	❍	❍
Na	❍	❍	
K	❍	❍	
Cl	❍	❍	
Ca	❍	❍	❍
P	❍	❍	❍
Mg	❍	❍	
µalbumine	❍	❍	(RD)
α1 µglobuline	❍	❍	
β2 µglobuline	❍	❍	
Citrate	❍	❍	
Oxalate	❍	❍	
Osmolalité	❍	❍	
Electro. Prot.	❍	❍	
Bence-Jones	❍	❍	

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MHEWS-DE-ALL-019 V2

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) ((M) à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH ((M) à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* ((V) à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* ((M) à 4°C)
❍ Vitamine E* ((M) à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou (RD)
❍ Chaînes légères libres
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance
Séd.+culture	❍		
Glucose	❍	❍	
Protéines	❍	❍	
Urée	❍	❍	❍
Créatinine	❍	❍	❍
Acide urique	❍	❍	❍
Na	❍	❍	
K	❍	❍	
Cl	❍	❍	
Ca	❍	❍	❍
P	❍	❍	❍
Mg	❍	❍	
µalbumine	❍	❍	(RD)
α1 µglobuline	❍	❍	
β2 µglobuline	❍	❍	
Citrate	❍	❍	
Oxalate	❍	❍	
Osmolalité	❍	❍	
Electro. Prot.	❍	❍	
Bence-Jones	❍	❍	

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MHEWS-DE-ALL-019 V2

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) ((M) à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH ((M) à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* ((V) à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* ((M) à 4°C)
❍ Vitamine E* ((M) à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

Médecin prescripteur

Cachet, signature et date : ..... /..... /.....

❍ **URGENT** ❍ SMS ❍ FAX ❍ TEL

Numéro GSM/FAX/TEL : .....

Copie au Dr .....

Renseignements cliniques :

.....

● A jeun ❍ Non à jeun

❍ Prélèvement sous MEOPA (formulaire obligatoire)

❍ Clinique CHC Hermalle	04 374 71 88
❍ Clinique CHC Heusy	087 21 37 30
❍ Clinique CHC MontLégia	04 355 63 00
❍ Clinique CHC Waremme	019 33 96 66
❍ Klinik St. Josef St. Vith	080 85 44 18

Date et heure de prélèvement :

.....

Lieu de prélèvement :

.....

Préleveur :

.....

Votre réseau de santé
Dein Gesundheitsnetzwerk

ETIQUETTE LABORATOIRE

NOM : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ...../...../..... Sexe : ❍ M ❍ F ❍ X

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ANALYSES

ETIQUETTE PATIENT OU A DEFAUT

[S4_109labanaly2 (version drdeberg-bro RDV postop)]

Adresse : .....

N° de reg. national : ..... Tél. : .....

HEMATOLOGIE (M)

● Hémoglobine
● Globules Rouges - Hct
● Globules Blancs
● Formule leucocytaire
● Plaquettes
❍ Plaquettes (sur citrate) (B)
❍ Réticulocytes
❍ Morphologie des GR

❍ Parasites sanguins
❍ Electrophorèse Hb
❍ Sphérocytose (formulaire)

Cytométrie de flux (V)

❍ Typage T-B-NK
❍ Typage CD4-CD8
Autres : voir demande spécifique
❍ B27 € (M)

ANEMIE (R)

● Fer ● Ferritine
● Transferrine (+ % saturation)
❍ Hémochromatose (M)(RD)
● Vit B12 (1x/an)
● Acide folique (1x/an)
❍ Ac. folique érythro. € (M)
❍ Haptoglobine

IMMUNO-HEMATO (M)

❍ Groupe ABOD
❍ Sous-groupes RH
❍ Carte de groupe (5€)
❍ Phénotypage érythrocytaire étendu
❍ Agglutinines irrégulières (RAI)
Date du Rhogam : .....

❍ Gène RHD fœtal (formulaire)
❍ Coombs direct
❍ Agglutinines froides
❍ Cryoglobulines (R sans gel à 37°C)

COAGULATION (B)

● Quick-INR (RD)
❍ Tps de céphaline activée
❍ Fibrinogène (ou VS) (RD)
❍ Temps de thrombine (RD)
❍ D-Dimères (RD)

Anti-Xa ❍ HBPM ❍ Xarelto
❍ Eliquis ❍ Lixiana

❍ PFA (+ 2e tube)
❍ Facteur VIII ❍ Facteur IX
❍ Ag vWF
❍ Activité vWF (ristocétine)

Autres : voir demande spécifique

THROMBOPHILIE (B)

* rens. cliniq. obligatoires
❍ <55a avec thrombose
❍ ATCD familiaux
❍ CIVD

❍ Protéine C *
❍ Protéine S *
❍ Antithrombine *
❍ APC Résistance *
❍ Facteur V Leiden * (M)
❍ Mut. Prothrombine * (M)

❍ Anticoagulant lupique (RD)
❍ TVP ❍ LED
❍ FC à répétition ❍ Autre €
❍ AC anti-cardiolipine (R)
❍ AC anti-β2 GP1 (R)

❍ Anti PF4 (score 4T.....)

BIOCHIMIE (R)

Foie-Pancréas

● TGO ou ❍ TGP
❍ LDH
● GGT
❍ Ph.alcalines
● Bilirubines Totale + Directe
❍ Acides biliaires €
❍ Amylase ou ● Lipase

❍ NH3 veineux (M à 4°C)
❍ NH3 artériel ou (M à 4°C)

Reins-Ions

● Urée
● Créatinine (+GFR)
❍ Acide urique
● Na
● K
● Cl ❍ HCO3-
● Ca ❍ Ca corrigé
● P
● Mg ❍ Osmolalité

Protéines spécifiques

● CRP ou ❍ VS (M)
❍ Protéines
❍ Electro. Prot. (RD) ou ● Albumine
❍ Immunoélectrophorèse ou (RD)
❍ Chaînes légères libres
❍ Amyloïdose
❍ Myélome à ch. légères
❍ Myélome non secrétant
❍ Myélome chez dialysés
❍ Autres €

❍ IgG ❍ IgG2
❍ IgA ❍ IgG3
❍ IgM ❍ IgG4 (2 à 16 ans)
❍ α1-antitrypsine
❍ C3 ❍ C4 ❍ CH50
❍ β2 microglobuline
● Préalbumine
❍ Procalcitonine €

EQUILIBRE ACIDE-BASE (V)

❍ pH artériel ou capillaire
❍ pH veineux

Glucides

● Glycémie ❍ Non à jeun (G)
❍ HbA1c (si diabète) (M)
❍ HbA1c € (M)
❍ Insuline ❍ C-peptide
❍ Acide lactique (G)
❍ AC anti-insuline
❍ AC anti-GAD (si < 40a)

Bilan lipidique et Risque CV

● Cholestérol Total
● Triglycérides
● HDL (+LDL calculé) ou ❍ ApoA
❍ ApoB ou O LDL dosé (si TT hypolip.)
❍ Lp(a) €

❍ CPK* ❍ CK-MB*
❍ Troponine I* ❍ Myoglobine*
❍ LDH* (*max 3 tests)
❍ NT-proBNP €

❍ CRP ultrasensible
❍ Homocystéine à jeun (R à 4°C) (RD)

CHIMIE URINAIRE

	Ech.	Ur24	Clearance
Séd.+culture	❍		
Glucose	❍	❍	
Protéines	❍	❍	
Urée	❍	❍	❍
Créatinine	❍	❍	❍
Acide urique	❍	❍	❍
Na	❍	❍	
K	❍	❍	
Cl	❍	❍	
Ca	❍	❍	❍
P	❍	❍	❍
Mg	❍	❍	
µalbumine	❍	❍	(RD)
α1 µglobuline	❍	❍	
β2 µglobuline	❍	❍	
Citrate	❍	❍	
Oxalate	❍	❍	
Osmolalité	❍	❍	
Electro. Prot.	❍	❍	
Bence-Jones	❍	❍	

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

MHEWS-DE-ALL-019 V2

MEDICAMENTS (R)

❍ Digoxine ❍ Lithium
❍ Valproate
❍ Carbamazépine
❍ Théophylline
❍ Lamotrigine (V)
❍ Lévétiracétam (V)
❍ Phénytoïne
❍ Phénobarbital

❍ Vancomycine
❍ Amikacine Pic ou
❍ Amikacine Vallée
❍ Gentamicine Pic ou (V)
❍ Gentamicine Vallée (V)

❍ Tacrolimus (M)
❍ Sirolimus (M)
❍ Ciclosporine (M)
❍ Ciclosporine 2H (M)
❍ Méthotrexate (V)
❍ Mycophénolate (M)
❍ 6-TGN (M)
❍ Uracile (formulaire) (M à 4°C)

SEROLOGIE (R)

Virale (max 8)

❍ Hépatite A IgM
❍ Hépatite B Ag surface
❍ Hépatite B Ac core
❍ Hépatite C

❍ Hépatite A Ac totaux (immunité)
❍ Hépatite B Ac surface (immunité)

Si AgHBs positif
❍ Hépatite B Ag e
❍ Hépatite B Ac e
❍ Hépatite D

❍ Hépatite E IgG+IgM

CMV IgG+ IgM (RD)
❍ Grossesse SA .....
❍ infection aigüe
❍ immunité €
❍ Hors grossesse

❍ EBV IgG+IgM
❍ Rubéole IgG (F) ❍ IgM
❍ H. simplex IgG ❍ IgM
(Si immunodéprimé)
❍ Varicelle IgG ❍ IgM
❍ Oreillons IgG ❍ IgM
❍ Parvovirus B19 IgG+IgM
❍ Rougeole IgG ❍ IgM
❍ HIV ❍ HTLV I/II
❍ Adénovirus
❍ Influenza A+B
❍ Parainfluenza 1-2-3
❍ Entérovirus
❍ Covid 19
❍ Covid 19 (hors INAMI) €

Bactérienne (max 4)

❍ Syphilis
❍ ASLO (< 18 ans et RAA)
❍ Borrelia IgG+IgM

❍ Brucella
❍ Bartonella IgG+IgM €
❍ Bordetella (formulaire)

Bactérienne (max 5)

❍ Mycoplasme IgG+IgM
❍ Chl. Pneumoniae IgG+IgA ou
❍ Chl. Trachomatis IgG+IgA
❍ Rickettsies (2 tests) (formulaire)
❍ Coxiella burnetii (fièvre Q) (4 tests) (formulaire)

Parasites (max 5)

Toxoplasmose IgG+IgM
❍ Grossesse SA .....
❍ Infection aigüe
❍ Immunité (2x/an)
❍ Hors grossesse

❍ Plasmodium
❍ Autres .....

Sérologie non infectieuse

❍ AAN + identification
❍ ENA
❍ DNA (si suivi)

❍ AC anti-muq. gastrique
❍ AC anti-mitochondries
❍ AC anti-muscles lisses
❍ AC anti-LKM
❍ AC anti-LC1
❍ AC anti-SLA €
❍ Panel myosite (antisynth.) €
❍ AC anti-CCP (1x/an)
❍ F. rhumatoïde

❍ ANCA + identification
❍ AC anti-MPO (si suivi)
❍ AC anti-PR3 (si suivi)
❍ AC anti-GBM

❍ ASCA IgG+IgA €
❍ AC anti-transglutaminase IgA
❍ AC anti-gliadine IgG

ALLERGIE (R)

❍ IgE
❍ Tryptase (mastocytose)
❍ DAO €

IgE spécifiques (max 6)

❍ g6 phléole ❍ h1 poussières
❍ t3 bouleau ❍ e1 chat
❍ w6 armoise ❍ e5 chien
❍ w9 plantain
❍ mx1 moisissures ❍ m3 Asp.fum.
❍ d1 acariens ❍ d2 acariens
❍ f1 bl oeuf ❍ f2 lait
❍ f4 froment ❍ f14 soja
❍ f76 α-lactalb.
❍ f77 β-lactoglob.

❍ rAsp f1+f2 ❍ rAsp f4+f6

Autres : voir demande spécifique

IgG spécifiques

❍ β-lactoglobuline €
❍ Soja €
❍ A. fumigatus (mucoviscidose)
❍ Caséine

❍ Ps.aeruginosa (mucoviscidose)
❍ Ag galactomannane

TOXICOLOGIE SANGUINE (R)

❍ Ethanol
❍ CDT €
❍ Benzodiazépines
❍ Barbituriques
❍ Tricycliques
❍ Paracétamol
❍ Salicylés
❍ Carboxyhémoglobine (V)
❍ Methémoglobine (V)
❍ Autres .....

TOXICOLOGIE URINAIRE

❍ Cannabis
❍ Benzodiazépines
❍ Amphétamines
❍ Méthadone
❍ Opiacés
❍ Barbituriques
❍ Cocaïne

❍ Cotinine €

HORMONOLOGIE URINAIRE

Urines de 24h

❍ Cortisol
❍ Aldostérone

Urines de 24h acides

❍ Catécholamines (Adr. Nadr. Dopa)
❍ Métanéphrines
❍ VMA ou ❍ HVA
❍ 5HIAA

HORMONOLOGIE (R)

Thyroïde

● TSH
● T4 libre ❍ T3 libre
(max 2 si euthyroïdie)
❍ AC anti-TPO ou ❍ AC anti-TG
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ AC anti-TSI (RD)

Grossesse

❍ ß-HCG
❍ Oestradiol
❍ Progestérone
❍ AMH €
❍ Pré-éclampsie 1er trim (PLGF) (formulaire)
❍ sFlt-1/PLGF (20 - 34 sem.) (RD)
❍ TPNI (formulaire +tube Streck)

Hypophyse

❍ LH
❍ FSH
❍ TSH
❍ Prolactine
❍ ACTH (M à 4°C)
❍ hGH (STH) ou ❍ IgF1

Gonades – Surrénales

❍ Testostérone
❍ SHBG (+ testo libre)
❍ Androstanediol glucuronide
❍ Oestrone

❍ Cortisol*
❍ Transcortine*
(+ Calcul cortisol libre)
❍ 11-désoxycortisol*
❍ 17-OH progestérone*
❍ Δ4-androstènedione*
❍ DHEA-Sulfate* (* Max 4)

❍ Aldostérone debout
❍ Rénine debout (M)

❍ Aldostérone couché (min. 1h)
❍ Rénine couché (min. 1h) (M)

MARQUEURS (R)

Monitoring (max 1)		Screening €
❍	CEA	❍
❍	CA19.9	❍
❍	CA125	❍
❍	CA15.3	❍
❍	NSE	❍
❍	β-HCG	❍
❍	AFP	❍

❍ PSA dépistage €
❍ PSA (>40a avec antécédents familiaux 1X/an)
❍ PSA (suivi néo 2x/an)
❍ PSA libre €

❍ Chromogranine A €
❍ Thyrocalcitonine
❍ Thyroglobuline (RD)
❍ Angiotensine convertase

METABOLISME OSSEUX (R)

● Ca ● P
❍ Calcium ionisé (V)
● PTH
❍ Vit D (max 1/an)
● Vit D (ins. rénale max 3/an)
❍ Phosph. alcaline osseuse*
❍ C-télopeptides* (CTX)
(*si pathologie osseuse)

DIVERS

❍ Quantiféron (tubes spécifiques) (formulaire)

❍ Porphyrines* (V à 4°C)
❍ Pb sanguin (V)

❍ Porphyrines urines* (4°C)
❍ Porphobilinogène* (4°C)
❍ Δ-ala urinaire* (4°C)

❍ Vitamine A* (M à 4°C)
❍ Vitamine E* (M à 4°C)
(* à l'abri de la lumière)

❍ Inh. C1 estérase activité (B)
❍ Inh. C1 estérase dosage € (R)
❍ Test à la sueur

Autres analyses

● Vitamine A
● Zinc

TESTS DYNAMIQUES (R)

HGPO (glucose + insuline) (G)

❍ + C-peptide

0'	30'	60'	90'	120'	180'	240'
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Grossesse ❍ Oui ❍ Non

Test à la TRH (TSH)

❍ + Prolactine

0'	15'	30'	60'	90'
❍	❍	❍	❍	❍

Test Synacthène (0' 30' 60')

❍ Cortisol ❍ 17-OH progest.
❍ 11-désoxycort. ❍ 21-désoxycort.

Test LH-RH

	0'	15'	30'	60'	90'	120'
LH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
FSH	❍	❍	❍	❍	❍	❍
hGH	❍	❍	❍	❍	❍	❍

Test dexaméthasone

❍ Cortisol

MHEWS-DE-ALL-019 V2

(M) Mauve (EDTA) (R) Rouge/Brun (sérum) (B) Bleu (citraté) (V) Vert (hépariné) (G) Gris (fluoré) (RD) RD : règles diagnostiques (https://www.chc.be/Laboratoire/Compendium)

PARCOURS RÉUSSITE

DES SUJETS QUI VOUS CONCERNENT APRÈS VOTRE CHIRURGIE BARIATRIQUE !



Clinique CHC MontLégia
Amphithéâtre
Route 520, 2e étage
Parking D

Séance d'informations animées par notre équipe multidisciplinaire.

Ces rencontres seront l'occasion d'échanger avec nos divers spécialistes, poser toutes vos questions et repartir avec des conseils pratiques pour optimiser votre récupération et garantir le succès de votre démarche.

Nous serions ravis de vous y retrouver pour continuer à vous accompagner et vous informer !

Le 3e mardi du mois
de 17 à 18h

MARDI 20 MAI
« La santé positive, introduction »

Dr Massart et Dr Colson, médecins spécialistes en médecine physique

MARDI 17 JUIN
« Le sucre : ami ou ennemi ? »

S. Malmendier et M. Thieren, diététiciennes

MARDI 19 AOÛT
« Devenez chirurgien d'un soir ! » Ateliers pratiques laparoscopiques avec votre chirurgien

Dr Debergh, chirurgien bariatrique

MARDI 16 SEPTEMBRE
« Comment se sentir mieux dans ses peaux »

Dr A. Bous, chirurgienne plastique

MARDI 21 OCTOBRE
« L'alimentation équilibrée »

S. Malmendier et M. Thieren, diététiciennes

MARDI 18 NOVEMBRE
« Des vitamines, pour quoi faire? »

Dr Heindrichs, endocrinologue

MARDI 16 DÉCEMBRE
Exercice physique thérapeutique

Dr Massart et Dr Colson, médecins spécialistes en médecine physique

INFOS PRATIQUES

~ Séances gratuites

~ Accessible à tous nos patients opérés et leur entourage

~ Infos et inscription (souhaitée mais non obligatoire) : chirabdomle@chc.be

Visitez notre site web
www.chirurgie-abdominale.be

CONTACTS UTILES

Visitez notre site web
www.chirurgie-abdominale.be

Chirurgiens
Secrétariat : 04 355 41 20



Dr A. Boitsios
alexi.boitsios
@chc.be
MontLégia/Heusy



Dr L. Brescia
lionel.brescia
@chc.be
MontLégia/Waremme



Dr N. Debergh
nicolas.debergh
@chc.be
MontLégia/Hermalle



Dr F. Jehaes
françois.jehaes
@chc.be
MontLégia/Hermalle



Dr L. Klein
laure.klein
@chc.be
Heusy

Médecin nutritionniste



Dr A. Schaeken
anne.schaeken
@chc.be
MontLégia/Hermalle

Coordinatrices de l'obésité



E. Castro
evy.castro
@chc.be
Hermalle



C. Lombard
christelle.lombard
@chc.be
MontLégia

Infirmière chef



Lidia Frezzotti
lidia.frezzotti
@chc.be
MontLégia

Psychologues



S. Baccus
sebastien.baccus
@chc.be
Hermalle



C. Nicolas
christelle.nicolas
@chc.be
MontLégia

Diététiciennes
04 355 68 39 ou 04 374 72 23



S. Malmendier
stephanie.
malmendier
@chc.be
MontLégia



J. Sterck
julie.sterck
@chc.be
MontLégia



M. Thieren
maurane.thieren
@chc.be
MontLégia



S. Kahack
sara.kahack
@chc.be
Hermalle

mle-chirabdo-bro RDV postop-2 (07-25)

Clinique CHC MONTLÉGIA
Votre hôpital est membre du réseau de santé move